

本
草
從
新

本草從新卷七目錄

木部 香木類二十五種

柏子仁 側柏葉 松脂 杉材 肉桂 桂心

桂枝 辛夷 沉香 丁香 白檀香 紫檀香

降真香 烏藥 乳香 沒藥 血竭 楓香脂

安息香 蘇合香 龍腦香 樟腦 阿魏 蘆薈

胡桐淚

本草從新卷七

木部 香木類

柏子仁 補心脾滋肝腎

辛甘而平氣香能透心脾 凡補脾藥多燥唯此香頗含脾性

潤能滋肝腎 如古曰肝經氣分藥 益智寧神聰耳明目 香通竅 養血止汗

心生血汗為心液 除風溼愈驚癇澤皮膚辟鬼魅 多油而滑作瀉

者禁與多痰亦忌 蒸晒炒研去油油透者勿入藥畏菊花

積德堂方治黃水濕瘡真柏油香油各二兩熬稠搽之如神

側柏葉 血清血分溼熱

味苦微寒性瀉而燥 西向得燥金之氣 最清血分溼熱止吐衄崩淋

腸風尿血血痢一切血證去風溼諸痺歷節風痛

肢節大痛
晝靜夜劇

名白虎歷節風
亦風寒溼所致

塗湯火傷

搗爛水
調塗

生肌殺蟲炙罨凍瘡汁烏

鬚髮

丹溪以為補陰要藥然終屬苦寒燥瀉之品唯血分

有溼熱者以此清之為宜若真陰虛者非所宜也 柏有數

種唯根上發枝數莖蒙茸茂密名千頭柏又名佛手柏者為

真或炒或生用桂牡蠣為使惡菊花宜酒

頭髮不生為
末和麻油塗

松脂

一名松香一名憑青

燥溼祛風

苦甘溫燥祛風去溼化毒生肌止痛熬膏而貼崩中惡瘰牙

疼研末而嘗

齧齒有孔松脂經
塞蟲即從齒出

感太陽之氣而生燥可去

溼甘能除熱故外科聽用極多性溫而燥血虛者勿服 水

煮百沸白濁方可用聖惠方治小兒緊

松節燥溼祛風苦溫而燥治骨節間之風溼丹溪曰能燥血中之溼

燥性過於松脂血虛尤忌 杵碎浸酒良

松毛祛風生毛髮苦溫可生毛髮宜敷凍瘡及風溼諸瘡

忌同松脂 切細用簡便方治陰囊溼癢松毛煎湯頻洗

松花潤益氣祛風甘溫潤心肺益氣止血除風亦可釀酒

須及時取用不堪久停今人善糝諸痘瘡傷損并溼爛不城

和白沙糖即為糕餅頗佳

多食發上焦熱病

杉材即杉木宜散腫脹

辛溫開發除心腹脹滿腳氣腫痛柳子厚藥救死方云得腳氣半夜痞絕脇塊如石皆

困且死鄭詢美傳杉木湯服半食頃大下塊散氣通方用杉木節一升橘葉一升無葉以皮代大腹檳榔七枚連子搗碎童便三升煮分二服若散風毒去惡氣洗毒瘡漆瘡霜挾一服得快利停後服

虛者忌用、其木不生白蟻燒灰最發火藥

肉桂 大燥補命門火平肝通血脈引火歸元

辛甘大熱有小毒氣厚純陽入肝腎血分補命門相火之不

足兩腎中間先天祖氣乃真火也人若無此真陽之火則無以蒸糟粕而化精微脾胃衰敗氣盡而亡矣益陽

消陰治痼冷沉寒下焦腹痛奔豚疝瘕疏通百脈宣導百藥

能抑肝風木得桂而枯削桂而扶脾土肝木盛則尅土辛平肝木甘益脾土療

虛寒惡食溼盛泄瀉土為木尅不能防水占行水方中多用之如玉苓散之類引無根之

火降而歸元從治欬逆結氣目赤腫痛格陽喉痹上熱下寒

等證

以熱攻熱名曰從治若肺熱氣不下行每上見熱證下見足冷設誤用之禍不旋踵

通經催生塗

胎幸熱能動血

交趾桂最佳

體鬆皮直起花紫肉黑油味甜多辣少今難得

其次蒙白

桂可用

距交趾不甚遠

其次安南桂東京桂亦可用

以上三宗體鬆皮直有花紫

肉黃油多黑油少味甜少辣多

姚桂潯桂紫荆桂

俱體重皮不直有花皆做上味甚辣畧甜

用之

不能治病洋桂雲南桂

體皆急重切開肉內有白點起絲味苦辣嘗之舌上稠膩甚至麻木

皆

大有害萬不可用

去粗皮

其毒在皮

不見火

須臨用切碎羣藥煎好方入煎一二

沸即服

得人參甘草麥冬良薑生葱石脂

足壁筋急桂末和白酒塗之外腎偏腫桂

末水調方寸匕塗之

桂心

大燥補陽活血

入心脾血分能引血化汗化膿內託癰疽痘瘡

同丁香治痘瘡灰塌消

瘀生肌補虛寒宣氣血利關節治風痺癰疽噎膈腹滿心腹

諸痛

桂枝 輕解肌調營衛

辛甘而溫氣薄升浮入太陰肺太陽膀胱經溫經通脈發汗

解肌 能利肺氣經曰治傷風頭痛 無汗 傷寒自汗 有汗能止

芍藥甘草為佐加薑棗 調和營衛使邪從汗出而汗自止 好

名桂枝湯能和營實表 古曰或問桂枝止煩出汗仲景治傷寒發汗數處皆用桂枝

湯又曰無汗不得用桂枝汗多者桂枝甘草湯此又能閉汗

也二義相通否乎曰仲云云太陽病發熱汗出者此為營弱

衛強陰虛陽必湊之故以桂枝發其汗此乃調其營氣則衛

氣自和風邪無所容遂自汗而解非若麻黃能開腠理發出

其汗也汗多用桂枝者以之調和營衛則邪從汗解而汗自

止非桂枝能開汗孔也○亦惟有汗者宜之若傷寒無汗則

當以發汗為主而不獨調其營衛矣故曰無汗不得服桂枝

有汗不得服麻黃以桂枝湯中有芍藥故也 亦治手足痛風脇風

痛風有風痰風經溼痰瘀血氣

虛血虛之異桂枝用作引經脇風屬肝桂枝能平肝東垣曰桂枝橫行手臂以其為枝也又曰氣薄則發泄桂枝上行而解表氣厚則發熱肉桂下行而補腎李士材曰肉桂乃近根之最厚者桂心即在中之次厚者桂枝即頂上細枝肉桂在下主治下焦桂心在中主治中焦桂枝在上主治上焦此本乎天者親上本乎地者親下之道也 桂性偏

陽陰虛之人一切血證最能動血不可誤投 木犀花辛溫同百

藥煎孩兒茶作膏餅噉生津辟臭化痰治風蟲牙痛同麻油

蒸熟潤髮及作面脂 桂葉搗碎浸水洗髮去垢除風

辛夷 一名木筆花一名迎春花○宣散上焦風熱

辛溫輕浮入肺胃氣分能助胃中清陽上行通於頭腦溫中

解肌通九竅利關節主治鼻淵鼻塞

肺主鼻膽移熱於腦則鼻多濁涕而淵風寒客

於腦則鼻塞經曰腦滲為涕王冰曰腦液不澄則為濁涕如泉不已故曰鼻淵及頭痛面黧黑斑可作面脂

目眩齒痛九竅風熱之病 辛香走竅虛人偶感風寒而鼻

塞者禁之頭痛屬血虛火熾者服之轉甚李時珍曰肺開竅於鼻陽明胃脈環

鼻上行腦為元神之府鼻為命門之竅人之中氣不足清陽

不升則頭為之傾九竅為之不利○人之記性皆在腦中小

兒善忘者腦未滿也老人健忘者腦漸空也凡人外見一形

必有一形留於腦中今人每記憶往事必閉目上瞪而思索

之此即竅神毛射肺去外皮毛令人發微焙芎藭為使惡石脂思

甚良 葛蒲石膏蒲黃黃連鼻淵鼻熱鼻塞瘡及痘後鼻瘡並出

沉香 宣調氣重暖腎

辛苦性溫諸木皆浮而沉香獨沉故能下氣而墜痰涎怒則氣生

能平肝 能降亦能升故能理諸氣而調中 東垣曰上至天下至泉用與使最相

宜 其色黑體陽故入右腎命門暖精助陽行氣溫中治心腹

疼痛噤口毒痢癰癥邪惡冷風麻痺氣痢氣淋肌膚水腫大

腸虛閉 氣虛下陷陰虧火旺者切勿沾脣 色黑沉水油

熟者良香甜者性平辛辣者性熱 鴟鵂斑者名黃沉如牛角黑者名角沉咀之輒削之

卷者名黃蠟沉甚難得半沉者為煎香棧香勿用 入湯劑

磨汁冲服入丸散紙裏置懷中待燥碾之忌火 吳球活人心統治胃冷久

呃沉香紫蘇白豆蔻仁各一錢為末每用柿蒂湯服五七分效

丁香 燥暖胃溫腎

辛溫純陽泄肺溫胃大能療腎壯陽事暖陰戶治胃冷壅脹

嘔噦呃逆

呃逆有痰阻氣滯食塞不得升降者有火鬱下焦者有傷寒汗吐下後中氣大虛者有陽明內熱失

下者有痢疾大下胃虛而陰火上沖者丹溪曰人之陰氣依胃為養上傷則木挾相火直沖清道而上古人以為胃寒用

丁香柿蒂不能清痰利氣唯助火而已時珍曰當視虛實陰陽或泄熱或降氣或溫或補或吐或下可也古方單用柿蒂

取其苦溫降氣濟生加丁香生薑以取其開鬱散痰亦嘗收效朱氏但執以寒治熱矯枉之過矣 疰瘕奔豚

腹痛口臭

丹溪曰脾有鬱火溢入肺中濁氣上行發為腦疰口臭治以丁香是揚湯止沸耳唯香薷最捷腦疰

齒齲痘瘡灰白不發

辛熱而燥非屬虛寒槩勿施用 雄

者顆小為丁香雌者顆大為母丁香即雞舌香畏鬱金忌火

證治要訣治食蟹致傷

丁香末薑湯服五分

白檀香

宣理氣

辛溫調脾肺利胸膈療噎膈之吐止心腹之疼辟鬼殺蟲開

胃進食

能引胃氣上升

紫檀香

重和血

鹹平血分之藥和營氣消腫毒數金瘡止血定痛一諸香動

火耗氣夏月囊香辟臭尙謂其散真氣而開毛孔況服之乎

一癰疽潰後諸瘡膿多及陰虛火盛俱不宜

降真香

宜辟惡止血生肌

辛溫辟惡氣怪異療傷折金瘡止血定痛消腫生肌

周崇被海寇刃

傷血出不止敷花蕊石散放效軍士李高用紫金藤散敷之

血止痛定明日結痂無癢曾救萬人紫金藤卽降真香之最

佳者也

忌同檀香

燒之能降諸真故名

烏藥

宜順氣

本草從新

白檀香 紫檀香 降真香 烏藥

六木部

辛溫香竈上入脾肺下通膀胱與腎能疏胸腹邪逆之氣一

切病之屬氣者皆可治

四磨湯治七情鬱結上氣喘急者降中兼收瀉中兼補也方用人參烏藥

沉香檳榔各濃磨

氣順則風散故用以治中氣中風

厥逆痰壅口噤

脈伏身溫爲中風身冷爲中氣又有痰爲中風無痰爲中氣局方治此亦用烏藥順氣散許學士云暴怒傷陰暴喜傷陽憂愁不已氣多厥逆往往得中氣之證不可作中風治○老人卒倒大抵氣血頹敗陰陽脫離而然景岳所謂非風是也若無痰氣阻滯者膀胱冷氣小便頻數白濁反胃吐食宿食當大補以固其脫

不消瀉痢霍亂女人血凝氣滯小兒蛻蛔外如瘡癰疥癬皆

成於血逆理氣亦可治之療貓犬百病 氣血虛而內熱者

勿服 根有車轂紋形如連珠者良酒浸一宿炒亦有煨研

用者

乳香 一名薰陸香。○宜活血舒筋

苦溫辛香。善入心通行十二經。能去風伸筋。筋不伸者調敷藥加用。

氣活血托裏護心。香微瘡孔能使毒氣外出。不致內攻。生肌止痛。治心腹諸痛。

口噤耳聾癰疽瘡腫產難折傷。皆取其活血止痛。亦治癩狂。能去風散瘀沈

存中靈苑方辰砂散辰砂一兩乳香棗仁各五錢酒下蒸飲

沈醉聽睡一二日勿動驚醒則不可治本事方加人參一兩

名當止洩痢。瘡疽已潰勿服膿多勿敷。出諸番圓大如

乳頭明透者良。今松脂楓脂中亦有此狀者市人或以偽之。性黏難研水飛過用

鉢坐熱水中以燈心同研則易細。山居四要玉莖作痛乳香葱白等分搗敷

沒藥 一名末藥。○宜散瘀定痛

苦平入十二經散結氣通滯血消腫定痛。血滯則氣壅氣壅則經絡滿急故腫

目生肌推陳致新能生好血治金瘡杖瘡惡瘡痔漏翳暈目赤肝經熱產

後血氣痛破癥墮胎乳香活血沒藥散瘀皆能消腫止痛生肌故每兼用諸痛不由

血瘀而由血虛產後惡露去多腹中虛痛癰疽已潰法當咸

禁出諸南番色赤類琥珀者良製法同上筋骨損傷米粉四兩炒黃入沒

藥乳香末各半兩酒調成膏攤貼之

血竭二名脂竭○和血斂瘡

甘鹹平有小毒色赤入血分肝散瘀生新專除血痛治金瘡

折跌瘡口不合止痛生肌乳香沒藥兼生氣血此則專入血分皆木脂善收瘡

口卻能引膿性急不可多用無瘀積者忌之出南番磨之

透甲燒之有赤汁涌出久而灰不變本色者真嚼之不爛如

蠟爲上

假者是海母血味大鹹有腥氣

須另研作粉篩退

若同衆藥搗則化作塵飛○瘡甲疼

痛及血痔俱爲末敷鼻衄以末吹之

楓香脂

卽白膠香○宣調氣血

辛平活血解毒止痛生肌治吐衄咯血齒痛風癰癰疽金瘡

外科取用甚多 色白微黃能亂乳香功亦相近

危氏方治金瘡筋絕

楓香末敷之

安息香

宣行氣血辟邪惡

辛香苦平入心經研服行血下氣安神去祟

手少陰主藏神神昏則鬼邪侵

之心主血血滯則氣不宣快安神行血故治之 鬼胎能下蠱毒可消燒煙辟邪逐惡

病非關惡氣侵犯者勿用 辟邪安息諸邪故名或云安

息國名也

奇效良方小兒驚邪安
息香一豆許焚之自除

蘇合香

宣通竅辟惡

甘溫走竅通竅開鬱辟一切不正之氣殺精鬼 今人濫用

蘇合丸不知諸香走散真氣每見服之輕病致重重病即死

唯氣體壯實者庶可暫服一二丸否則當深戒也

別錄謂其
可以久服

筆談甚言飲蘇合酒之效嗚呼
立言失當貽害無窮此類是也

出諸番合衆香之汁煎成

故又名蘇合油形如藕膠以筴挑起懸絲不斷者真

龍腦香

一名冰片○宣通竅散火

辛溫

綱目云微寒蓋
體溫而用涼也

香竅善走能散先入肺傳於心脾而透

骨通諸竅散鬱火逐鬼邪聰耳明目消風化溼治驚癇痰迷

目赤膚翳

乳調點之

耳聾鼻癰

鼻中瘕肉點之自出皆通竅之功

喉痺舌出

未嘗

痛齒痛

治骨痘陷

豬心血作引酒服或紫草湯服引入心經能發之

產難

新汲水調

三蟲五

痔 風病在骨髓者宜之若在血脈肌肉輒用腦麝反引風

入骨如油入麪莫之能出目不明屬虛者不宜入點

節齋曰冰片大

辛熱用之點眼取其拔出火邪蓋火鬱發之從治法也世人誤以為寒而常用之遂致積熱害目故云眼不點不瞎者此也○芳香為百藥之冠香甚者性必溫熱

出南番云是老杉脂以白如冰作梅

花片者良

今人有以樟腦升打亂之以杉木炭養之則不耗○牙痛冰片硃砂末各少許搗之立止內外痔冰

片分半慈

汁化搽之

樟腦

宣通竅除溼

辛熱香竄能於水中發火

置水中招益熾

通關利滯除溼殺蟲置鞋

中法腳氣

集要云和烏頭為末醋丸彈子大置足心微火烘之汗出為效薰衣篋辟蛀蟲

以樟木切片井水煎成

小兒禿瘡樟腦一錢花椒二錢脂亦二兩共為末以退豬湯洗過搽之

阿魏

海消積殺蟲

辛平入脾胃消肉積殺細蟲去臭氣

諺云黃芩無假阿魏無真劉純玉機微義云阿

魏無真卻有真臭而止臭是為珍

解葷菜白死牛馬肉毒治心腹冷痛瘧痢

瘧病多由積滯而起

傳尸疳勞疰蠱

人之血氣聞香則順聞臭則逆

虛人雖有痞積當先養胃氣胃強則堅積漸磨而消矣勿宜

用此臭烈更傷胃氣

出西番木脂熬成極臭試取少許安

銅器一宿沾處白如銀汞者真

人多以胡蒜白麝之

用鉢研細熱酒器

上煨過入藥

清熱殺蟲

大苦大寒功專清熱殺蟲涼肝明目鎮心除煩治小兒驚風

漱齒

以鹽湯漱淨敷之

溼癬

甘草末減半和敷

吹鼻殺腦疳除鼻癢

脾

胃虛者忌投

出波斯國木脂也味苦色綠者真

胡桐淚

瀉熱殺蟲

苦能殺蟲鹹能入骨輕堅大寒能除熱治咽喉熱痛

磨掃取涎齒

驅風疳骨槽

今口齒家多用為要藥

結核癰癰

切勿多服令吐無休

出涼肅乃胡桐脂入土得斥鹵之氣結成如小石片名石

淚入藥最勝木淚乃樹脂流出者其狀如膏油不堪用

牙痛宜

膿血臭氣者胡桐淚一兩枸杞根一升每用五錢煎湯熱漱

二五斤

煎膏

胡桐淚

木

部

本草從新卷八目錄

木部 喬木類二十四種

黃蘗 槐實 苦楝子 桑皮 樗根白皮

櫻櫚 沒石子 訶黎勒 厚朴 皁筴 皁筴刺

肥皁筴 水楊枝葉 西河柳葉 榆白皮

海桐皮 杜仲 合歡皮 蕪荑 烏柏木根皮

蘇木 乾漆 大風子 巴豆

本草從新卷八

木部 喬木類

黃蘗 瀉相火保瀝清熱

苦寒微辛沉陰下降瀉膀胱相火足太陽引經藥除溼清熱療下焦

虛非真能補也腎苦燥急食辛以潤之腎欲堅急食苦以堅之相火退而腎固則無狂蕩之患按腎本屬水虛則熱矣

心木屬火骨蒸勞熱諸痿癱瘓熱甚則傷血血不榮筋則更虛則寒矣骨蒸勞熱諸痿癱瘓短而為拘溼勝則傷筋筋不

束骨則弛長而為痿合蒼朮名二妙散清熱利溼為治痿要藥或兼氣虛血虛脾虛腎虛溼痰死血之不一宜隨證施治

目赤耳鳴腎火消渴黃疸水腫便閉王善夫病便閉腹堅如石

通服不效東垣曰此奉養太過膏梁積熱損傷腎水致膀胱乾涸小便不化火又逆上而為嘔噦難經所謂關則不得小便

便格則吐逆內經所謂無陰則陽無以化也遂處以北方大苦寒之劑黃蘗知母各一兩酒洗焙研桂一錢為引名滋腎

本草從新 黃蘗 槐實 十 木部

丸服二百丸未幾前陰如刀水瀉熱痢痔血腸風瀉下赤白

刺火燒湯出如泉腫脹遂消
皆淫熱 諸瘡痛癢凍瘡乳調 頭瘡未 口瘡蜜炒研合凡日瘡

為病 中氣不足虛火上炎宜用反治之法參未甘草補土之
虛乾薑散火之標甚者加附子或喻官桂引火歸元 殺蟲

安蚘 必尺脈洪大按之有力方可用若虛火誤服有寒中

之變 川產肉厚色深者良生用降實火蜜炙則庶不甚傷

得炒黑能止崩帶酒製治上蜜製治中鹽製治下惡乾漆得

知母良時珍曰知母佐黃蘗滋陰降火有金水相生之義古

云黃蘗無知母猶水母之無蝦也蓋黃蘗能制命門
膀胱腎中之火知母能清肺金滋腎之化源○

千金方治小兒重舌黃蘗浸竹瀝塗之甚妙
槐寶 即槐角○瀉風熱清肝涼大腸

苦寒清肝膽涼大腸疏風熱治煩悶風眩痔血腸風糞前有血名外

痔瘻後有血名內痔穀道有肉名舉痔頭上有孔名痔瘻瘡
內有蟲名蟲痔大注用槐角地榆生地人參涼血生血防風
秦艽祛風溼歸芎和血黃芩枳殼寬腸升麻升
提治腸風略同不宜專用寒涼須兼補劑收功陰瘡溼癢明
目去淚清肝淚固齒烏髭槐乃虛星之精十月上已採漬牛
膽中陰乾百日食後吞一枚髮白
還黑腸風痔殺蟲墮胎槐性純陰虛寒者宜戒即虛熱而
血尤宜服之

非實火亦勿妄投 去單子及五子者銅槌搗碎牛乳拌蒸

槐花渴熱涼血 苦涼功同槐實涼血治風熱目赤赤白泄

痢五痔腸風吐崩便衄諸血舌土出血加線者
名舌衄炒研參之 忌同槐實

含蕊而陳久者佳微炒

苦楝子 一名金鈴子○瀉溼熱治疝殺蟲

苦寒有小毒能導小腸膀胱之熱因引心包相火下行通利

小便為疝氣要藥亦治傷寒熱狂熱厥腹痛療瘡疥殺三蟲

夷堅志云消渴證有蟲耗其津液者取根皮濃煎少加麝服下其蟲而渴自止 苦寒止宜於殺蟲

脾胃虛寒者大忌 川產良酒蒸待皮軟寒因熱用刮去皮取肉

去核凡使肉不使核使核不使肉如使核搥碎茴香為使

花 鋪蒲下殺 蚤蟲驗

秦皮 鴻熱治目疾瀉止痢

苦寒色青性瀉以其除肝熱而平木故治目疾洗服皆效驚癇風

淫諸痺以其收瀉故治崩帶下痢 苦寒清熱是其所長綱

目謂其久服輕身益精有子未必然也 出西土皮有白點

漬水碧色書紙不脫者真今藥客俱以此皮縛北細辛大戟

為使濕吳茱萸赤眼生翳水煎秦皮一兩澄清日日溫洗

檳榔白皮即臭椿根皮○瀉腸燥溼

苦燥溼寒勝熱瀉收斂入血分而瀉血去肺胃之陳痰治溼

熱為病泄瀉久痢崩帶腸風夢遺滑精有斷下之功一婦年四十餘

耽飲無度多食魚蟹積毒在臟日夜二三十瀉便與膿血雜下大腸連肛門甚痛用止血痢藥不效用腸風藥益甚蓋腸風有血無膿也服熱藥腹愈痛血愈下服冷藥注瀉食減脈虛平藥則若不知年餘垂髫或教服人參散檳皮人參各一兩為末空心溫酒或米飲下二錢遂愈去疳蟲 苦寒之性虛寒者禁之賢家

真陰虛者亦忌以其徒燥耳痢疾積滯未盡者勿遽用勉強

固牆必變他證 藥功用相倣差不及爾

椿根白皮即香椿根皮 主用相倣力稍遜之 根東引者良去粗

直生斤 椿根皮 檳榔 沒石子 三 木部

皮醋炙或蜜炙忌豬肉熱麪止入丸散不入湯煎

櫻櫚 瀉止血

苦能泄熱瀉可收脫燒黑能止血

紅見黑則止同側柏卷柏燒存性飯丸止遠年下血

亦可煎服

治吐衄崩帶腸風下痢

惟去血過多滑而不止者宜

之若早服恐停瘀爲害

年久敗櫻良與髮灰同用尤佳燒

黑須存性不可燒過膏地上出火毒

沒石子

一名無食子○瀉精外用藥鬚

苦溫入腎瀉精固氣強陰助陽止遺淋除洩痢收陰汗烏鬚

髮性偏止瀉不宜多用獨用

山大食諸番顆小紋細者

佳揀去蟲食成孔者忌銅鐵器用漿水於砂盆中研焙乾再

研如烏犀色

牙齒疼痛綿裹沒石子末一錢咬之涎出吐去效

詞黎勒一名詞子○瀉腸斂肺瀉氣

苦溫以泄氣消痰

海魚放涎凝滑船不能行投詞子湯尋化為水化痰可知

酸濇以斂肺

收脫除脹滿下食積利咽喉通津液開音止渴治冷氣腹脹

膈氣嘔逆痰嗽喘急瀉痢脫肛腸風崩帶

同烏梅倍于則收斂同陳皮厚朴則

下氣得人參治肺虛寒嗽得陳皮沙仁治冷氣腹脹佐白木蓮子治虛寒久瀉佐椿皮治腸澼便血同蛇牀五味山茱續

斷杜仲治虛寒帶下

嗽痢初起者勿服雖酸濇卻又泄氣氣虛者亦

忌性溫若肺有實熱瀉痢因溼熱氣喘因火冲者法咸禁之

丹溪以為降火殊為不然東垣以為嗽藥中不可用亦屬偏見

從番舶來嶺南亦有六稜

黑色肉厚者良酒蒸一伏時去核焙生用清金行氣熟用溫

胃固腸 核止欬及痢

厚朴 瀉下氣散滿

苦降能瀉實滿辛溫能散溼滿

脹滿證不同消補貴得其宜

積宜消導痰滯宜行痰按熱宜清熱溼宜利溼寒鬱入足者散寒怒鬱者行氣蓄血者消瘀不宜專用行散藥

太陰陽明

脾胃

平胃調中

佐蒼朮為平胃散平瀼土之太過以致於中和

消痰化食行

結水破宿血散風寒殺臟蟲治反胃嘔逆喘欬瀉痢冷痛霍

亂一切客寒犯胃溼氣侵脾之證

但可施於元氣未虛邪

氣方盛若脾胃虛者切勿沾唇雖一時未見其害而清純冲

和之氣潛傷默耗矣孕婦服之大損胎元

榛樹皮也肉厚

紫潤味辛者良刮去粗皮切片薑汁炒乾薑為使惡澤瀉硝

石忌豆

犯之動氣

阜筴

一名阜角○宜通竅搜風

辛鹹而溫有小毒入肺大腸兼入肝經性極尖利搜風溼熱吹之導之則通上下關竅而涌吐痰涎搐鼻立作噴嚏治中

風口噤胸痹喉痹

凡中風不醒人事口禁不能進藥急提頭髮手掐人中用阜筴末或半夏末吹入鼻

中有嚏者生無嚏者為肺氣已絕死或用稀涎散吐之阜筴末一兩白礬五錢每用一錢溫水調灌或加藜蘆少麝鴉調探喉令微吐稀涎再用服之則除溼去垢最去油膩宣壅導

滯取由段湯泡服和老人風秘

消痰破堅殺蟲下胎治風溼風癩痰喘腫

滿堅癥囊結

厥陰肝脈絡陰器寒客肝經則為囊結

塗之則散腫消毒煎膏貼

一切痺痛合蒼朮焚之辟瘟疫溼氣

濟急頗有神效稍涉

虛者切勿輕與孕婦忌之 一種小如豬牙一種長而枯燥

一種肥厚多脂者良去皮子弦或蜜炙酥炙絞汁燒灰柏實

為使惡麥冬畏人參苦參

性能消鐵不結痰者鑿樹一孔入鐵封之則結痰矣雖見之久則

成孔故此木

子去皮水浸軟煮糖漬食之治大腸燥結

汪

不能燒之

日其性得溼則滑時珍曰亦辛

燥癰惡瘡

卒病頭痛阜筴末吹鼻取嚏不道

阜筴末

吹之

阜筴刺

宜通竅潰癰

辛溫搜風殺蟲功同阜筴其鋒銳直達病所潰散癰疽治腫

毒妬乳

乳癰汁不出內結成腫名妬乳

風癰

癰瘻乃營氣熱風寒客於脈而不去也經曰脈風成爲癰脈與

營皆血也蒸曬爲末大黃湯調下

癰瘡

米醋熬嫩刺塗之

胎衣不下

爲癰疽未潰

之神藥已潰勿服孕婦亦忌 葉洗風瘡

肥皁筴 瀉熱毒

平溫微毒除風溼去垢膩 澡身豐面多用之 療無名腫毒有奇功不

奇瘍惡毒用生肥皁去子弦及筋搗爛醋和敷立愈不愈再敷奇驗此方方書未載若貧人僻地倉卒無藥者用之甚便

水楊枝葉 宣行氣血

苦平痘瘡頂陷漿滯不起煎湯浴之 此因氣凝血滯或風寒外束而然宜用水楊枝

葉無葉用嫩枝五筋流水一釜煎湯溫浴如冷添湯良久照見紫起有暈絲者漿行也如不滿再浴之虛人只洗頭面手足屢浴不起者死初出及癢塌者皆不可浴若內服助氣血藥其效更速此方有變理之妙蓋黃鍾一動而蟄蟲啟戶東風一吹而堅冰

解凍之義也

西河柳葉 一名赤柳柳○宜解毒

甘鹹而平消痞解酒利小便療諸風解諸毒近又以治痧癰

熱毒不能出外用為發散末服四錢治痧疹不出喘嗽

榆白皮滑利發下有形滯物

甘平滑利入大小腸膀胱經通二便利諸緩行經脈慘淫熱

滑胎產或胎死腹中服汁亦可下下有形蓄著之物治五淋腫滿肩作粥食小便

痿痺不眠陸康養生論云榆令人興瘰癧疥癬禿瘡消赤腫如乳和陳醋

六七易效十劑曰滑可去著有赤白二種采皮為麴荒年

當糧可食香料用之黏滑勝於膠漆去粗皮取白小兒蟲瘡榆皮末和

瘰癧塗綿上覆之立瘥

火灼爛瘡榆皮膏塗之

海桐皮

宜祛風溼

苦平入血分祛風去溼殺蟲能行經絡達病所治風驚頑癰

腰膝疼痛傳信方海桐薤苳各二兩牛膝芩薊羌活地黃皮五加皮各一兩生地十兩酒二斗浸飲疳積

牙蟲煎服或含漱疥癬日赤洗腰膝痛非風溼者不宜出廣

南皮白堅韌作索不爛風癰有蟲海桐皮蛇牀子未等分臘豬脂調搽

杜仲補腰膝

甘溫能補微辛能潤色紫入肝經氣分潤肝燥補肝虛子能

令母實故兼補腎肝充則筋健腎充則骨強能使筋骨相著

皮中有絲有筋治腰膝痠痛經曰腰者腎之府轉移不能腎

骨相著之象筋將竭矣一少年新娶得脚軟病且痛甚作脚氣治不效孫

琳曰此腎虛也用杜仲一兩半酒半水煎服六日全愈按腰

痛不已者屬腎虛痛有定處屬死血往來走痛屬痰積腰冷

身重遇寒即發屬寒溼或痛或止屬溼熱而其原無不有開

於腎以張者

陰下涇廣小便餘瀝胎漏

懷孕胎墮

受孕一兩

月以杜仲八兩糯米煎湯浸透少斷絲續斷二兩酒浸山藥

六兩糊丸或煮肉丸米飲下二禁大補腎氣托住胎元則胎

不墮

腎雖虛而火熾者勿用

產湖廣湖南者仁

色黃皮去

粗皮剝或酥炙蜜炙鹽酒炒薑汁炒斷絲用惡元參

川杜仲色黑皮

厚肉薄

不堪用

合歡皮

一名夜合○和調心

仁平安五臟和心志令人歡樂無憂

心為君主之官土為萬物之母二臟調和則五

臟自安神明自暢養生論云合歡蠲忿正謂此也

和血止痛明目消腫續筋骨長肌

肉丹溪曰補陰之功甚捷與白蠟同入膏用神效而外科未用何也

塗蜘蛛咬

生油殺蟲

不拘入煎為末熬膏外治竝妙得酒良

蕪黃

宣散風溼消積殺蟲

辛散滿苦殺蟲溫燥溼化食

諸蟲皆因溼而生氣食皆因寒而滯祛五臟皮膚

肢節風溼心腹積冷瘕痛癰瘰

直指方云瘕酒人血入於脂為酒人多氣人血入於氣為

氣竅虛勞人敗血雜痰為血竅如蟲之行上侵人咽下蝕人肛或附脇背或隱胸腹唯用蕪黃炒兼暖胃理氣益血之藥

乃可痔瘻瘡癰小兒驚疳冷痢

得漏日胃中蟲痛為末米飯

下脾胃虛者雖有積勿槩投寒而掄笑陳久氣羶者良

牙齒作痛以蕪黃仁安蛀孔中及縫中甚效

烏柏木根皮

為熱毒

苦涼性沉而降利水通腸功勝大戟療疔腫解砒毒

凡患腫毒中砒

毒者不拘根皮花葉搗汁多飲得大利即愈

鹽麝痰喘

柏樹皮去粗搗汁和飛麝作餅焙熟早晨與兒喫三

本草

蕪黃

烏柏木根皮

蘇木

木

部

四箇荷吐下鹽泥乃極能瀉下稍虛者忌 柏油塗一切

腫毒瘡疥 蟻瘡舊絹作衣化油塗之即著

蘇木 瀉行血祛風

甘鹹辛平入三陰血分行血去瘀宣表裏之風

元素曰宜與

此之治風即治風先治血血行風自滅之義不宜與防風同用也 治產後人之上癰欲死

時後百一方煮汁服海藥方加乳香酒服未加不後改血土

之實證也若挾虛氣喘面黑欲死乃敗血乘虛人肺也用蘇

木二兩水二碗煮一碗入人參末一兩服隨時加減神效不

可謂古產後去血多氣隨血去脈微神倦口鼻氣合胸腹無

痛 無瘀滯者忌之 出蘇方國故又名交變亦有忌鐵

刀斧斷指外以

鐵

乾漆 瀉破血消積殺蟲

辛溫毒烈功專行血殺蟲破年深凝結之積滯瘀血積筋骨

絕傷

損傷必有瘀血停滯

血見乾漆即化為水其能損新血可知虛

人及慣生大瘡者戒之勿為丹溪飛補之說所誤

中其毒者杉木湯紫

蘇湯蟹湯俱可解之生漆瘡者浴之

炒令煙盡為度或燒存性半夏為使畏

川椒紫蘇雞子蟹

漆得蟹而咸水

大風子

燥痰外用治瘡

辛熱有毒取油治瘡癰疥癩有殺蟲劫毒之功

丹溪曰粗工治大風病佐

以大風油殊不知此物性熱有燥痰之功而傷血致有病將愈而先失明者

出南番子中有仁

白色久則油黃不用入丸藥壓去油

臣等神方治手背皴裂大風子漆泥塗

巴豆 通大燥大瀉

本草綱目

卷八

辛而大熱大毒開竅宣滯去臟腑沉寒最爲斬關奪門之將

大黃巴豆同爲峻下之劑但大黃性寒厥病多熱者宜之巴豆性熱厥病多寒者宜之故仲景治傷寒傳裏多熱者多用

大黃東垣治五積破痰瘰癧血痕氣痞食積生冷硬物所傷大

腹水腫瀉痢食時珍曰一婦年六十瘡瀉五載投主冷油膩肉

胃久傷積食凝滯法當以熱下之用蠟置巴豆丸五十驚癰

口喎耳聾牙疼喉痹兩嚙金一錢巴豆十四粒去皮油爲丸

每服五分准膳下雄黃破結氣鬱金散惡血巴豆下稠涎然

係厲劑不可輕用或用紙燃蘸巴豆油然火刺喉或搗巴豆

綿裹隨左右納鼻吐出惡涎殺蟲通經爛胎油作紙燃然火

紫血卽寬鼻雖少生瘡無礙

吹息或薰鼻或刺喉能出惡涎惡血治中風中惡痰厥氣厥

喉痹不通一切急病 元素曰不可輕用鬱滯雖開真陰隨

損以少許著肌膚即起泡泥腸胃柔薄之質無論下後耗損

真陰即臟腑被其薰灼能無潰爛之患耶萬不得已亦須炒

熟去油入少許即止 或用殼用仁用油生用炒用醋煮燒

存性用 好古曰去心皮膜油生用為急治水穀道路之劑炒

去煙令紫黑用為緩治消堅毒積之劑可以通腸可

以止 去油名巴豆霜芫花為使畏大黃黃連原水 中其毒者

為也 或黑豆綠得火良 虎毒黑子巴豆一錢石灰拌過 根皮治

豆汁亦佳 癰疽發背腦疽鬚疽 人信一錢糯米五分炒研點之

癰疽發背腦疽鬚疽 取先傳教患處留頭炒不可 言○收根陰

言○收根陰 臨時水搽亦可

本草從新卷九目錄

木部 灌木類二十八種

桑根白皮

乾桑枝

乾桑葉

乾桑葢

楮實

枳實枳殼

梔子

酸棗仁

蕤仁

山茱萸

金櫻子

郁李仁

女貞子

五加皮

枸杞子

地骨皮

石楠葉

蔓荊子

沐槿

木芙蓉

狗骨

南燭

枸橘葉

山茶花

密蒙花

八角金盤

柞木

荊瀝

苞木類四種

竹瀝

竹筴

竹葉

天竹黃

寓木類六種

琥珀

茯苓

茯神

猪苓

雷丸

桑寄生

本草從新卷九

木部 灌木類 苞木類 寓木類

桑根白皮 瀉肺行水

甘辛而寒瀉肺火

鎮乙瀉白散桑皮地骨各一兩甘草五錢每服二錢類米百粒煎時珍曰桑皮地骨

皆能瀉火從小便出甘草瀉火緩中梗米清肺養血乃瀉肺諸方之準繩也利二便散瘀血下氣

行水止嗽清痰

肺中有水則生痰而作嗽十劑曰燥去淫桑白皮赤小豆之類是也

治肺熱

喘滿唾血熱渴水腫臃脹

肺虛無火及因風寒而嗽者勿

服 刮去薄皮取白或生用或蜜炙

制其涼潤之性為線可縫金瘡

續斷桂心為使忌鐵

小兒流涎脾熱也胸膈有痰新桑根白皮搗自然汁塗之甚效或乾者煎水塗

亦可

乾桑枝 宣祛風

苦平通關節行津液祛風利水治風寒溼痺諸痛在手足者尤效以其

入四水氣脚氣桑枝一升細剉炒香水三升熬至二

乾桑葉 涼血祛風

苦甘而涼得金氣而柔潤不周故喻嘉滋燥涼血止血刀斧

為末乾言清燥救肺湯以之為君去風長髮明目採經霜者煎湯洗眼去風淚洗手足

桑九除溼祛去風痺桑葉黑芝麻等分密丸名扶風烏鬚明目代茶止消渴末服止盜汗嚴州有僧每就枕汗

透二十年不能療監寺教採帶露桑葉出遍身比旦衣被皆培乾為末空心米飲下二錢數日遂愈用經霜者

乾桑葢一名文武實○補肝腎

甘酸而溫色黑入腎而補水桑乃箕星之精其利五臟關節精英盡在於此

安魂鎮神聰耳明目生津止渴

煉膏又能治服金石藥熱渴

利水消腫解

酒烏鬚 不可多食多食致衄

日乾為末蜜丸良新鮮桑

葇濾汁熬膏入蜜煉稠點湯和酒竝妙入燒酒經年愈佳日

湯點服亦治瘰癧名文武膏

取極熟者

楮實

二名穀實。鴻賴堅

甘寒而利消水腫療骨哽明目賴堅

時珍曰則錄大明皆云大補益而修真秘書又

云久服令人骨痿濟生秘覽治骨哽用楮實煎湯豈非賴骨之徵乎。南唐書云烈祖食餚喉中噎國醫莫能愈吳廷紹

獨請進楮實湯一服疾失去羣醫他日取用皆不驗叩延紹答云噎因甘起故以此治之此即治骨哽賴堅之義爾羣醫

用治他噎故不驗也洛按陶隱居蘇頌抱朴子皆甚言其功而方書用之為補者除楊氏還少丹而外不多見其他如外

臺秘要用以敷治身面石疽機要用以治水氣熱服集簡用以治喉風喉痺直指用以治肝熱生翳無非涼潤賴堅之義

則古本諸說
未可信也

水浸取沉者酒蒸 皮甘平善行水治水腫

氣滿皮可為紙摺汁和白芨飛

葉甘涼祛溼熱治老少下

痢瘴痢為未白痢瘴湯下赤痢沙

枳實枳殼薄破氣行痰

苦酸微寒皆能破氣氣順則痰行喘止痞脹消脾無積血心

在上則生脹腹東垣曰枳實治刺痛息後重除治胸痺結胸

下而主血枳殼治上而主氣食積五膈痰癖癥結嘔逆欬嗽水腫脇脹瀉痢淋閉痔腫腸

風所主略同但枳實利胸膈枳殼寬腸胃枳實力猛丹溪曰

痰能衝枳殼力緩為少異時珍曰殼實上世未分魏晉始分

海藏始分殼主氣實主血然仲景治上焦胸痹痞滿用枳實古方治下血痢痔腸秘後重用枳殼則實不獨治下而殼不

獨治土也蓋自飛門至魄門皆肺主之三焦相通一氣而已

大損真元脹滿因於邪實

者可用若因土虛不能制水肺虛不能行氣而誤用之則禍

不旋踵氣弱脾虛以致停食痞滿法當補中益氣則食自化

痞自消若再用此破氣是抱薪救火矣孕婦虛者尤忌元素曰枳

殼泄氣走大腸損胸中至高之氣○昔湖陽公主難產方士

進瘦胎飲用枳殼四兩甘草二兩五月後日服一錢潔古改

以枳朮名東胎丸冠宗奭明其不然蓋孕婦全賴血氣以養

胎血氣充實胎乃易生彼公主奉養太過氣實有餘故可服

之若概施則誤矣呂用晦曰瘦胎束胎名目亦啟粗工攻伐

之門○時珍曰八九月胎氣盛壅滯用枳殼蘇梗以順氣胎

前無滯則產後無虛也 皮厚而小為枳實殼薄虛大為枳

殼陳者良麩炒用

今人於六七月採小香藥偽為枳實枳殼又有採枸橘偽為者

梔子 瀉心肺三焦之火

苦寒輕飄象肺色赤入心瀉心肺之邪熱使之屈曲下行由

小便出海藏曰或用為利小便藥非利小便乃肺清則化行而膀胱津液之腑得此氣化而出也而三焦

之鬱火以解熱厥厥有寒熱二證心痛以平丹溪曰治心痛當分新久若初起因寒因食宜

溫散久則鬱而成熱若用溫劑不助痛添病乎古方多用梔

子為君熱藥為之向導則邪易失此病雖日久不食不死若

痛止恣食病吐衄崩淋血痢之病以息最清胃脘之血炒治

心煩懊憹不眠仲景用梔子豉湯好古曰煩者氣也躁者血也故梔子治肺煩香豉治腎躁亦用作吐藥

以邪在土焦吐之則邪散經所謂其高者因而越五黃古方

之也按梔豉湯吐虛土客熱瓜蒂散吐痰熱客寒五黃多用

梔子茵陳五淋目赤紫癥白癘皰瘡瘍皮膜肺所損胃伐氣

虛者忌之心腹痛不因火者尤為大戒世人每用治血不知

血寒則凝反為敗證本草匯曰治實火之血順氣為先氣行則血自歸經治虛火之血養正為先氣

壯則自能攝血丹溪曰治血不可單行單止亦不可純用寒涼○氣有餘而逆為火順氣即是降火 內熱用

仁表熱用皮生用瀉火炒黑止血薑汁炒止煩嘔鼻止衄

酸棗仁 補肝膽斂汗寧心醒脾

甘酸而潤生用酸平專補肝膽 今人專以為心炒熟酸溫而

香亦能醒脾助陰氣堅筋骨除煩止渴 斂陰生津斂汗服固表藥

而汗不止者用棗仁炒研同生地白芍北五味 寧心動心皆由

麥冬龍眼肉竹葉煎服多掇以汗為心液也 溫膽湯中或加用之肝虛

膽怯所致經曰凡十 療膽虛不眠 則膽亦虛肝不藏魂故不

一官皆取決於膽也 寐血不歸脾臥亦不安金匱治虛勞虛煩不眠用酸棗仁湯

此補肝之劑經曰臥則血歸於肝蘇頌曰一方加桂一兩二

方棗仁皆生用治不得眠則生用酸棗仁好眠之說未可信

也蓋膽熱必有心煩口苦之說何以反能好眠乎若肝火鬱

于胃中以致倦怠嗜臥則當用辛涼透發肝火如柴薄之屬

本草從新 酸棗仁 卷仁 山藥 四

非棗仁所得司也 痿痺久瀉酸收瀉 香舒脾 肝膽二經有實邪熱者勿用

炒香研惡防已

蕤仁一名白接○消風清熱治目

甘微寒消風清熱和肝明目退翳膜赤筋理背傷淚出凡目疾在

表當疏風清熱在裏屬腎虛血少神勞宜補腎養血安神 破心下結痰除腹中痞氣皆熱邪為

崇 曰病不緣風熱而因於虛者勿用 叢生有刺實如五

味圓扁有紋紫赤可食湯浸取仁去皮尖水煮過研膏蕤仁一兩

細辛半兩苦竹葉二把水二升煎一升澆汁頻溼洗治飛血眼

山茱萸補肝腎瀉精氣

酸溫微溫固精秘氣補腎溫肝強陰助陽安五臟通九竅聖濟

總錄云如何滑精以通九竅經疏云精氣充則九竅通利
菴曰山黃通九竅古今疑之得經疏一言而意旨豁然始歎
前人識見深遠不易測識多有如此類者即能發汗與通
經疏一語而擴充之實可發醫人之慧悟也
屬陰陰血乾枯汗從何來唯補陰助陰始有雲蒸雨致之妙
初菴曰酸劑斂滑何以反發恐屬誤文何其明於彼而昧于
此也暖腰膝縮小便治風寒溼痹溫肝故鼻寒目黃則目黃
耳鳴耳聾腎虛則耳鳴耳聾皆固精通竅之功好古曰滑則氣脫滑劑所以收之土材曰酸屬東方而功多在
北方者乙月事過多強陽不痿小便不利者不宜用
核核能滑精陳久者良惡防已防風桔梗

金櫻子滑精固腸

酸澹平固精秘氣治滑精膏和芡實為丸泄痢便數性澹

而不利於氣丹溪曰經絡隧道以通暢為和平昧者喜其澹精而服之致生別證自作不靖咎將誰執時珍

日無故而服以縱慾則不可
若精氣不固者服之何害
似榴而小黃赤有刺取半黃

者熟則去刺核研或熬膏熬膏則甘
純甘
全失瀉味

郁李仁瀉氣破血潤燥

辛苦甘平性降下氣行水破血潤燥治水腫瘰癧急大腸氣滯

關格不通用酒能入膽治悸目張不瞋
一婦因大惡而病愈後目張不瞋錢乙曰

目系內連肝膽恐則氣結膽橫不下郁李下後令人津液
潤能散結隨酒入膽結去膽下而目瞋矣

虧損燥結愈甚乃治標救急之藥津液不足者慎勿輕投

湯浸去皮尖蜜浸研如膏

女貞子補陰除火

甘苦涼少陰之精隆冬不凋益肝腎安五臟強腰膝明耳目

烏鬚髮補風虛除百病

女貞酒蒸曬乾二十兩桑葉乾十兩

月卽搗桑葉汁七月卽搗是蓮汁和藥不必用蜜時珍曰女貞上品妙藥古方罕用何哉

純陰至靜之

品唯陰虛有火者宜之否則腹採作瀉

女貞冬青時珍作

二種實一物也

近人放蠟蟲於此樹

冬至痛佳酒蒸

搗汁熬膏淨瓶收固埋地中七日每

田點眼治風熱赤眼

五加皮

宣祛風溼補壯筋骨

辛順氣而化痰苦堅骨而益精溫祛風而勝溼逐皮膚之瘰

血療筋骨之拘攣

腎得其養則妄水去而骨壯肝得其養則邪風去而筋強

治虛羸五緩

五臟筋脈緩縱

陰痿囊溼女子陰癢小兒腳弱明目縮便愈瘡療疔

釀酒尤良

王綸曰風病飲酒能生痰火惟五加浸酒益人

下部無風寒溼邪而有

本草從新

五加皮

枸杞子地骨皮

木

卷九部

火及肝腎虛而有火者勿服 莖青節白花赤皮黃根黑上

應五車之精故名芬香五藥者佳遠志為使惡元參 葉作蔬

食去皮
膚風溼

枸杞子 滋補肝腎而潤

甘微溫滋肝益腎 景岳曰用之以 生精助陽補虛勞強筋骨

肝主筋 養營除煩去風明目 肝開竅於目黑利大小腸治噎

乾消渴 謬曰離家千里勿食枸杞以其色赤屬火補精壯陽

目而治 便滑者勿用 南方樹止數尺北方並是大樹以

甘州所產紅潤少核者佳酒潤搗

地骨皮 涼血除虛熱

甘淡而寒降肺中伏火除肝腎虛熱能涼血而治五內煩熱

熱淫於內治以甘寒地骨一斤生地五斤酒煮服治帶下吐血尿血搗鮮汁服消渴欬嗽清外

治肌熱虛汗上除頭風痛肝有熱則自生風與外感中平胸

脇痛肝清下利大小腸療在表無定之風邪傳尸有汗之骨蒸

東垣曰地骨皮瀉腎火能治外熱地為陰骨為裏皮為表朱

二允曰能退內潮人所知也能退外潮人實不知病或風寒

散而未盡作潮往來非柴葛所能治用地骨走表又走裏裏

藥消其浮游之邪服之未有不愈者特表明之時珍曰枸杞

地骨甘寒平補使精氣充足而邪火自退世人多用苦寒以

芩連治上知藥治下致傷元氣惜哉子嘗以青蒿佐地骨退

熱屢有殊功中寒者勿用甘草水浸一宿葉名天精草苦甘而

涼清上焦心肺客熱代茶止消渴婦人陰腫或生瘡地骨皮煎水頻洗效

石楠葉 宜去風堅腎

平苦平有毒散風堅腎利筋骨皮毛逐諸風療風痺腳弱浸酒飲治頭風爲末吹鼻愈小兒通睛小兒誤跌或打著頭腦受驚肝系受風致瞳人不正宜石楠散吹鼻通頂石楠一兩藜蘆三分瓜丁三七箇爲末每吹少許入鼻一日三度內服午黃平肝藥祛風通利是其所長補腎之說未可信也 關中者佳炙用五加皮爲使惡小蘗

蔓荊子 輕宣散上部風

味苦辛平輕浮升散而搜風通利九竅治溼痺拘攣頭痛腦鳴太陽脈絡於腦目痛齒痛齒雖屬腎爲骨之餘而上齦屬足陽明下齦屬手陽明陽明風熱上攻則動搖腫痛頭面風虛之證 頭痛目痛不因風邪而因血虛有火者思之元素云胃虛人不可食恐生痰疾 產南皮縣去膜打碎用亦

有酒蒸 惡石膏烏頭乳癰初起酒

木槿鴻熱

苦涼活血潤燥治腸風瀉血痢後熱渴作飲服令人得睡擦

頑癬及蟲瘡

癬瘡有蟲用川槿皮肥阜水浸時時搽之或浸汁磨雄黃尤妙

不宜多服

川產者良

肉厚而色紅者真

用根皮

赤白帶下川槿皮二兩白酒碗半煎一碗空心服白帶用紅酒

甚妙

木芙蓉

瀉涼血解毒

辛平性滑涎黏清肺涼血散熱止痛消腫排膿治一切癰疽

腫毒有殊功

用芙蓉花或葉或皮或根生搗或乾研末密調塗四圍中間留頭乾則頻換初起者即覺清涼

痛止腫消已成者即膿出已潰者即易斂瘍科祕其名為清涼膏清露散鐵絛散皆此物也或加赤小豆末或蒼耳燒存

木槿

木芙蓉 狗骨 南燭

木 剖

性為未加 用花葉 經木不止芙蓉花蓮蓬殼 入亦妙 等分為末米飲下二錢效

狗骨 即豺兒刺。補陰

甘微苦涼益肝腎 用木皮浸酒服 生津止渴 用葉代 茶甚妙 祛風 補腰脚令健

葉燒灰淋汁或 有刺俗名老鼠刺又名八角茶 藏器曰此 煎膏塗白癰風 木肌白如

狗之骨樹如杜仲詩云南山有枸是也陸機詩疏云其狀如 櫨木理白滑可為函板有木重 在葉中卷之如子羽化為蜚

蘇頌曰多生江浙間取以旋盆器甚佳時珍曰葉有五刺如 貓之形故名樹如女貞肌理甚白葉長二三寸青翠而厚硬

四時不凋五月開細白花結實如女貞及菝葜子九月熟時 緋紅色皮薄味甘核有四瓣人採其木皮煎膏以塗鳥雀謂

之黏 鴉

南燭 補陰

苦酸澇平強筋益氣力止泄除睡久服輕身長年令人不飢

變白卻老 子酸甘平強筋骨益氣力固精駐顏 一名南

天燭

時珍曰吳楚山中甚多葉似山香光滑而味酸清結實如朴樹子成簇生青九月熟則紫色內有細子其味甘

酸人家多植庭除間接古今詩話云即楊桐也葉似冬青而小臨水生者尤茂寒食採其葉漬之染飯魚青而先能資陽氣謂之

青精飯

何橘葉

宜解毒

辛溫治下痢膿血後重

同草薺等分炒香性研每茶調二錢喉癭消腫導毒

方咽喉生瘡眉屑如疊不痛日久有瘻出臭氣廢飲食用臭橘葉煎湯連服必愈

一名臭橘

樹葉與

橘同但幹多刺三月開白花青蕊不香結實大如彈丸形如枳實而殼薄人家多收種為簾籬或收小實為充枳實及青橘皮售之

刺風蟲牙痛以一合煎汁含之

山茶花

瀉涼血

微辛甘寒涼血治吐衄腸風下血湯火傷灼

麻油調塗

用紅者

于婦人髮臚研末搽之

密蒙花

潤肝明目

甘而微寒潤肝燥治目中赤脈青盲膚翳赤腫眇淚羞明怕

日小兒疳氣攻眼產蜀中樹高丈餘葉冬不凋其花繁密

蒙茸故名揀淨酒潤焙

密蒙黃葉根末各一兩水九梧子大每臥時湯服十丸至十五治目翳效

八角金盤

瀉破瘀

苦辛溫毒烈治麻痺風毒打撲瘀血停積

其氣猛悍能開通壅塞痛淋立止虛

人慎

植高二三尺葉如皂梔而八角秋開白花細簇取

近根皮用

柞木 通利數催生

苦平下行利竅主難產催生 此木堅忍可爲鑿柄故俗名

鑿子木橫生逆產用舊鑿柄多經斧敲已經卷轉者尤妙

藥治腫毒癰疽

荆瀝 宣通經絡消瘀瀉熱

甘平除風熱化痰涎開經絡行氣血治中風失音驚癇痰迷

眩暈煩悶消渴熱痢爲去風化痰妙藥

延年秘錄云熱多用竹瀝寒多用荆瀝丹

溪云虛痰用竹瀝實痰用荆瀝並宜薑汁助送則不凝滯

氣虛食少者切戒 牡荊俗

名黃荊截取尺餘架甌上中間火炙兩頭承取瀝○以上灌

木類

竹瀝 湯火滑痰潤燥

甘苦寒滑清痰降火 虛者宜與參並行人參固其經竹瀝通其絡則甘寒氣味相得益彰 治中

風口瘰 經疏云中風要藥凡中風未有不因陰虛火旺痰熱

之痰迷大熱 丹溪曰痰在經絡四肢皮膚裏膜外者非此不能

而有痰者宜之若寒溼胃虛腸滑之人服之則反傷腸 卒然

牙疼 經疏竹瀝 風癰癩狂自汗煩悶消渴反胃 和米煮 寒

胃滑腸有寒溼者勿用 竹能損氣軟虛人 竹類甚多淡竹

肉薄節間有粉多汁而甘最良篋竹堅而節促皮白如霜苦

竹本粗大葉長濶筍味苦入藥惟此三種取竹瀝如取荊瀝

法薑汁為使 薑能除痰且濟其寒故每兼用○小兒

吻瘡竹瀝和黃連黃蘗黃丹傳之效

竹筴 瀉上焦煩熱涼血

甘而微寒開胃土之鬱清肺金之燥涼血除熱治上焦煩熱

溫氣寒熱膈噎嘔皖胃熱吐血衄血清肺涼胃齒血不止浸醋含之肺痿驚癇

清肝崩中胎動涼胎刮去青皮用第二層齒血不止醋浸

火背上葉瀉上焦煩熱

竹葉

辛淡甘寒涼心緩脾消痰止渴除上焦風邪煩熱葉在上故治上焦仲

景治傷寒發熱大渴有竹葉石欬逆喘促嘔噦吐血中風失

音小兒驚癇 凡用竹瀝竹筴竹葉須生長甫及一年者為

嫩而有力 竹根同葉煎湯洗婦人子宮下脫

天竹黃

瀉熱豁痰涼心

甘而微寒涼心經去風熱利竅豁痰鎮肝明目功同竹瀝而

性和緩無寒滑之患治大人中風不語小兒客忤驚癇為尤

宜久用亦能寒中

出南海大竹之津氣結成

即竹內黃粉

片

片如竹節者真○以上苞木類

琥珀

通行水散療安神

甘平以脂入土而成寶故能通塞以寧心定魂魄療癲邪

從

墜藥則安心神

色赤入手少陰足厥陰血分

肝

故能消瘀血破癥瘕

生肌肉合金瘡

從辛溫藥則破血生肌

其味甘淡上行能使肺氣下降

而通膀胱

經曰飲食入胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱凡滲藥皆上行而後

下故能治五淋利小便燥碑上從淡滲藥則又能明目磨翳

淡滲傷陰凡陰虛內熱火炎水虧者勿服若血少而小便

不利者服之反致燥急之苦 松脂入土年久結成韓保昇

入地亦能結成以手心摩熱拾芥者真以柏子仁入瓦鍋同煮半日

搗末

茯苓 通行水寧心益脾

甘平益脾寧心淡滲利竅除溼色白入肺瀉熱而下通膀胱

能通心氣於腎使熱從小便出然必上行入肺清其化源而

後能下降利水故潔古謂其上升東垣謂其下降各不相背

也 治憂悲驚悸心下結痛寒熱煩滿口焦舌乾口為脾竅舌為心苗火下

降則 熱降 欬逆嘔噦膈中痰水水腫淋瀝泄瀉遺精因溼熱故宜

小便結者能通多者能止

素問曰肺氣盛則便數

生津止渴

溼熱去則津生

功專行水伐腎小便不禁虛寒精滑及陰虧而小便不利者

皆勿妄投

松根靈氣結成產雲南色白而堅實者佳去皮

產浙江者色雖白而體鬆其力甚薄
近今茯苓頗多種者其力更薄矣

赤茯苓

通利溼熱

白者入肺膀胱氣分赤者入心小腸氣

分

時珍曰白入氣赤入血

益心脾白勝利溼熱赤勝

茯苓皮

通行水

專能行水治水腫膚脹

以皮行皮之義五皮散用之凡腫而

煩渴便閉溺赤屬陽水宜五皮散疏鑿飲不煩渴大便溏小便數屬陰水宜實脾飲流氣飲腰以上腫宜汗腰以下腫宜

利小便

茯神

通行水寧心

主治與茯苓同而入心之用居多開心益智安神養神療心

虛驚悸多悲善忘 卽茯苓抱根生者其抱心故入心之用多去皮及

中木 茯神心木名黃松節療諸筋攣縮偏風喎斜心掣健忘心木

一二兩乳香一錢石器炒研名松節散每服二錢木瓜湯下治一切筋攣疼痛乳香能伸筋木瓜能舒筋也 二茯

俱惡白藪畏地榆秦艽鼈甲雄黃忌醋面黥雀斑用白茯苓末蜜和夜夜敷之二

七日

愈

豬苓 通行水

苦甘淡平泄滯利竅入膀胱腎經升而能降開腠發汗利溼

行水與茯苓同而泄較甚治傷寒瘟疫大熱經疏曰大熱利小便亦分消之

意 懊懣消渴溼熱腫脹淋濁瀉痢瘡癰瘡多由暑暑必兼溼經日夏傷於暑秋爲瘡瘡

本草經新 豬苓 雷丸 桑寄生 主 木部

宗奭曰損腎昏目潔古云淡滲燥亡津液無溼者勿服

多生楓樹下塊如豬屎故名

馬屎曰通豬屎曰苓
苓卽屎也古字通用

白而實者

良去皮

雷丸

瀉消積殺蟲

苦寒有小毒入胃大腸經功專消積殺蟲

遜齋開覽云楊勛
傳吳疾每發語腹

中有小聲應之久漸聲大有道士曰此應聲蟲也但
讀本草取不應者治之讀至雷丸不應服數粒而愈

殺蟲

之外無他長能令人陰痿

竹之餘氣得霹靂而生故名大

小如栗竹刀刮去黑皮甘草水浸一宿酒拌蒸或炮厚朴羌

花爲使惡葛根

小兒出汗有熱雷丸
末二兩粉四兩撲之

桑寄生

補筋骨散風溼

苦堅腎助筋骨而固齒長髮甘益血止崩漏而下乳安胎舒
筋絡而利關節和血脈而除痹痛外科散瘡瘍追風溼海
外深山地暖不蠶桑無採埒之苦氣化濃密自然生出有言
鳥啣他子遺樹而生者非也他樹多寄生恐反有害莖葉並
用忌火胎動腹痛桑寄生兩半阿膠艾葉各半兩水盞半煎
一盞去滓溫服或去艾葉又治腸氣生桑寄生搗汁
服之○以上寓木類

本草從新卷十目錄

果部 五果類六種

杏仁

巴旦杏仁

烏梅

桃仁

栗

大棗

山果類十五種

梨

柿

木瓜

山查

橘皮

青皮

香櫞

香欒

花紅

枇杷葉

楊梅

石榴皮

銀杏

胡桃

榛

夷果類九種

荔枝核

龍眼肉

橄欖

榧子

海松子

檳榔

大腹皮 枳椇子 落花生

味類五種

川椒 秦椒 胡椒 吳茱萸 茶

蔬類五種

瓜蒂 西瓜 甘蔗 白沙饅 紫沙饅

水果類十種

蓮子 石蓮子 蓮蕊鬚 藕節 藕 荷葉

菱 茨實 勃薺 慈菇

本草從新卷十

果部 五果 山果 夷果 味類 蔬類 水果

杏仁 瀉肺解肌潤燥

辛苦甘溫而利有小毒瀉肺降氣行痰解肌除風散寒利胸

膈氣逆通大腸氣秘

東垣曰杏仁下喘治氣喘有療狂治血俱治大便秘當分氣血脈浮屬氣晝便

難而陽氣秘者用杏仁陳皮肺與大腸相表裏實門在上魄門在下為氣之

用桃仁陳皮肺與大腸相表裏實門在上魄門在下為氣之

通道故並以陳皮佐之○杏仁潤燥消積索麵豆粉治時行頭

仁紫苑並能解肺鬱利小便

痛上焦風燥欬逆土氣

炒研蜜丸含嚥煩熱喘促其毒性又能殺蟲

治瘡制錫毒狗毒

消狗肉積

因虛而欬嗽便閉者忌之雙仁者

殺人 去皮尖炒研發散連皮尖研得火良惡易根黃芩黃

杏子酸熱有小毒損人孕婦忌

巴旦杏仁 潤肺下氣

甘平止欬下氣消心腹逆悶 有溼痰者勿服 以其性潤也

形扁皮白尖彎如鸚哥嘴者真 仁出山東河南不入藥

烏梅 清腸斂肺

酸澀而溫脾肺血分之果清腸斂肺 肺欲收急食 止血涌痰

消腫解毒生津止渴 時珍曰梅花於之而實於夏得木之全 氣故最酸膽為枝木肝為乙木人舌下

有四竅兩通膽液 醒酒殺蟲治久嗽瀉痢 血痢尤良 梁莊 故食酸則津生 醒酒殺蟲治久嗽瀉痢 肅公血痢陳應之

用烏梅胡黃連竈下土等分為末茶調服而愈 曾魯公血痢 百餘日 醫不能療應之用鹽梅肉一枚研爛含臘茶入醋

服一嚥 瘳霍亂吐逆反胃下血血崩安虬厥 虬蟲上坎而 而安 瘳霍亂吐逆反胃下血血崩安虬厥 虬蟲上坎而

則去黑痣蝕惡肉痘愈後有肉突起燒存性研病有當發

表者大忌酸收誤食必為害 青梅熟黑為烏梅 稻灰汁淋

不羈○大便不通氣奔欲死者烏梅十顆 湯浸去核入棗大納入下部少時即通 產安吉者肉厚多

脂最佳合溪者次之長沙梅福

白梅 酸澀鹹平功用略同烏梅治痰厥僵仆牙關緊閉取肉

指擦牙根涎出即開蓋酸先入筋齒驚癇喉痹梅核膈氣取

輕即易開若用鐵器攪開恐傷其齒青牛黃梅子每箇用鹽一兩淹一日夜曬乾又浸又曬至水

盡乃止用青錢三箇夾二梅麻線縛定通裝磁罐內封埋地

下百日取出每用一枚含之嚥汁入喉即消 敷乳癰腫毒刺

入肉中搗爛罨之即出瘡中力箭傷膚搗敷血多食損齒

傷朋經曰酸走筋筋病無多食酸若過鹽漬為白梅取大

青梅

以鹽汁漬之日曬夜漬十日成矣久乃上霜故又名鹽梅。
衣生微點者梅葉煎湯洗之即去清木採梅葉洗蕉葛衣經
夏不脆
有驗
根葉治休息痢及霍亂煮濃汁飲之

桃仁 薄破血潤燥

苦平微甘苦以泄血滯甘以緩肝氣而生新血

成無已曰肝者血之源血

聚則肝氣燥肝苦
急急食甘以緩之

通大腸血秘治熱入血室

衛脈

血燥血痞損

傷積血血痢經閉欬逆上氣

血和則氣降

皮膚燥癢

肌有血凝

發熱如

狂 若小腹滿痛小便
自利者為畜血

若非血瘀而誤用之大傷陰氣

泡

去皮尖炒研碎雙仁者有毒不可用香附為使

婦人陰癢桃仁杵爛綿裏

塞之產後陰腫桃
仁搗碎傳之俱妙

桃花 通大瀉

苦平下宿水除痰飲消積聚利二便療風狂

蘇頌杜陽編載范純佑女喪夫發狂閉之室中夜斷窗牖登
桃樹食花幾盡自是遂愈以能瀉痰飲滯血也○儒門事親
載一婦瀉瀉數年百治不效或言此傷飲有積也桃花落時
以棘鍼刺取數十莠勿犯人手以麴和作餅煨熟食之米飲
送下不一二時瀉下如傾六日行以攻決爲用但可施於
至數百行昏困唯飲涼水而平

氣實有餘之證若無故而因除百病美顏色諸謬說而服之
爲害不小 三月三日採花凍淨以絹袋盛懸簷下陰乾于
葉者勿用

桃葉 宜發汗

苦平殺蟲發汗

凡傷寒風痺發汗不出以火燒地用水灑之布乾桃葉於

上厚二三寸席臥溫覆取大汗被中敷粉極燥便瘁凡麥麴蠶沙皆可如此法用

采嫩者名桃

入藥尤勝

桃子辛酸甘熱微毒多食令人有熱生癰

無益五果列桃爲下以此與麴同食患心痛服朮人尤忌之

桃梟

是桃子在樹經冬苦不落者正月採之

微溫有小毒辟邪祛祟白禿頭瘡乾桃一兩黑丑一合為末臘豬脂調搽

栗補腎

鹹溫厚腸胃補腎氣能解羊瘧小兒不可多食生則難化熟則

滯氣小兒疳瘡生疳栗子敷之

大棗補脾胃潤心肺調營衛和百藥

甘溫補中益氣滋脾土潤心肺調營衛緩陰血生津液悅顏
色通九竅助十二經和百藥傷寒及補劑中加用之以發脾

胃升騰之氣須與薑並行紅藍功用相倣差不及爾雖補中

而味過於甘中滿者忌之甘令人滿大建中湯心下痞者減傷寒與甘草同例○經言棗為脾

果脾病宜食之又曰脾病人毋多食甘毋乃相戾耶不知言宜食者指不足之脾也如脾虛泄瀉之類毋多食者指有餘

之脾也如實滿腫脹之類凡用藥者能隨其虛實而變通之雖尋常品味必獲神功苟執而泥之雖有良劑莫展其長故學者以格致為亟也凡風疾痰熱及齒痛俱非所宜小兒疳病亦禁生

者尤為不利北產肥潤堅實者佳金華南棗及橄欖所產皮薄而皺花紋甚細而

可愛味雖甘美而微帶酸且脂少於北棗止可充食用皆不堪入藥宏景曰南棗大惡不堪啖蘇頌曰江南出者堅燥少脂不可入藥殺烏附毒忌葱魚同食諸瘡久壞不愈者棗膏三升煎水頻洗取愈○食椒閉氣

食事即解○以上五果類

梨涼心潤肺利大小腸

甘寒微酸涼心潤肺利大小腸丹溪曰梨者利也止嗽消痰流利下行之謂也

清喉降火生之可清六腑之熱熟之可滋五臟之陰實火宜生虛火宜熟除煩解渴潤燥消

風人知其清火消痰醒酒解毒經疏曰膏粱之家厚味醞酒縱肆無節必多痰火癰疽卒

本草從新
梨
柿
四
果
部

中之患難數食梨能治傷寒發熱熱嗽痰喘中風失音搗汁

轉重為輕變危為安聖惠方梨汁煮粥治小兒心腹風熱昏躁切片貼湯火傷脾虛泄瀉乳婦及金

瘡忌用搗汁用熬膏亦良加薑汁蜂蜜佳清痰止嗽與萊

菹相間收藏則不爛

柿 潤肺寧嗽瀉腸

生用甘冷潤肺止欬嗽清胃理焦煩乾柿甘寒而瀉瀉腸止

洩潤肺寧嗽而消宿血治肺痿熱欬產寶云產後欬逆咯血

反胃有人三世病反胃至孫以腸風下血痔漏肺與大腸相表裏瀉清則

肺熱亦除方勺泊宅編柿柿霜乃其津液生津化痰清上

革燒灰飲服二錢治下血焦心脾之熱為尤佳治咽喉口舌瘡痛柿性頗寒肺經無

火及風寒作嗽冷痢滑洩者忌之 若與蟹同食令人腹痛

作瀉 柿蒂止呃逆 古方單用取其苦溫降氣濟生加工 香生薑取其開鬱散痰亦從治之法

木瓜 和脾舒筋瀉熱

酸瀼而溫和脾理胃斂肺伐肝化食 酸能斂斂則止渴 酸能化與山查同

氣脫能收氣滯能和調營衛利筋骨 筋急者得之即舒 筋緩者遇之即利 去溼

熱消水脹治霍亂轉筋 邪傷脾胃清濁不分揮霍擾亂上吐 下瀉甚則肝木乘脾而筋為之轉也

時珍曰肝雖主筋而轉筋則因風寒溼熱之傷脾胃所致轉

筋必起於足腓腓及宗筋皆屬陽明木瓜治轉筋取其理脾

以伐肝也土病則金衰而木盛故用酸溫以收脾肺之

耗散而藉其走筋以平肝邪乃土中瀉木以助金也 瀉痢

脚氣 脾主四肢或寒溼傷于足絡或胃受溼熱之物上輸於 脾下流至足則成脚氣惡寒發熱狀類傷寒第腫脹

痛為異爾宜利溼清熱忌用補劑及淋洗昔有患足痺者趁

舟見舟中一袋以足倚之比及登岸足已善步矣詢袋中何

木瓜 山查

果 部

物乃木腰足無力多食損齒及骨病癰閉酸收太甚酸瓜也

瀉之品世用治水腫腹脹誤矣有大寮舟過金陵愛其芬馥購數百頃置之舟中舉舟人皆病溺不得出醫以通利罔效迎于視之聞四面皆木瓜香笑謂諸人曰撤去此物爾即出矣不必用藥也于是盡投江中頃之溺即如舊

者良忌鐵反花痔瘡木瓜為末以鯉魚身上炙調貼之以紙護住○辟除壁登木瓜切片鋪於席上

山杏古字作糖○瀉破氣消食化痰散瘀

酸甘微溫健脾行氣消食磨積善去腥羶油膩之積與麥芽

肉投數枚則易爛其消肉積可知散瘀化痰發小兒痘疹行乳食停留止見

枕作痛惡露積於太陰少腹作痛名見枕痛砂糖調服療小腸疝氣荷香多食令

人嘈煩易飢反伐脾胃生發之氣凡服人參不相宜者服山查即解一補氣一破氣也

胃中無積及脾虛惡食者忌服有大小二種小者入藥一

名棠隄子去皮核

核亦有用化食
磨積治疳催生

橘皮

宣理氣調中瀉燥溼消痰

辛能散溫能和苦能燥能瀉為脾肺氣分之藥

脾為氣母肺
為氣籙凡用

補藥瀉藥有宜佐
陳皮以利氣者

調中快膈導滯消痰

大法治痰以健脾順
氣為主潔古曰陳皮

枳殼利其氣
而痰自下

定嘔止嗽利水破癥宣通五臟統治百病皆取

其理氣燥溼之功入和中藥則留白入疏通藥則去白去白

名橘紅兼能除寒發表

皮能發
散皮膚

氣雖中和亦損真元無滯

勿用 廣產為勝皮厚不脆有豬棕紋

福建產者名建皮力
勝浙江衢州出者名

衛皮更
惡劣矣

陳久者良故又名陳皮

陳則烈氣消無燥散之患半
夏亦然故同用名二陳湯

治痰欬重便浸曬治痰積薑汁炒入下焦鹽水炒

化相陳皮
消痰甚靈

然消伐太峻不宜輕用况此物真者絕少無非抽皮而已

青皮寫肝破氣收積

辛苦而溫色青氣烈入肝膽氣分疏肝瀉肺凡瀉氣藥皆瀉肺引諸

藥至厥陰之分柴胡疏上焦肝氣下飲食入太陰之倉破滯

削堅消痰散痞治肝氣鬱積脇痛多怒久盧結癖入肝散邪

故清脾飲胸膈氣逆疝痛乳腫丹溪曰乳房屬陽明乳頭屬厥陰乳母或因忿怒鬱悶厚

味釀積致厥陰之氣不行故發不得出陽明之血騰沸故熱

甚而化膿或因其子有滯痰隔熱含乳而睡噓氣致生結核

者初起便須忍痛揉軟吮令汁透自可消散治法俱宜以青

皮疏肝滯為主再加石膏清胃熱括輓消腫甘草節解毒餘如沒藥橘葉金四花蒲公英阜角刺當歸皆可隨最能發汗宜用之少佐以酒久則四白名乳巖不可治矣性頗猛銳如人年少壯未皮能達皮辛當發散氣虛及有汗者忌用免躁暴及長大而為補皮

如人至老年烈性慙減經久而為

橘之青而米黃者

恒方無用

者未以後始

去瓢切片醋拌炒

陳皮升浮入脾肺治高青皮沉降入肝膽治低炒之以醋

所謂肝欲散急食辛以散之以酸泄之以苦降之也

葉治乳癰脇癰肺癰

苦能入厥陰行肝氣

消腫散毒

肉生痰聚氣

時珍曰橘皮下氣消痰其肉生痰聚飲表裏之異如此

核

治疝痛腰腎冷痛去皮炒

香櫟

俗作圓一名佛手柑古名枸櫟音矩員○理氣止嘔健脾進食

辛苦酸溫入肺脾二經理上焦之氣而止嘔進中州之食而

健脾除心頭痰水治痰氣欬嗽

煮酒飲

心下氣痛

性雖中和

單用多用亦損正氣須與參朮並行乃有相成之益爾 陳

久者良

根葉功用略同

香藥 下氣消食快膈化痰

苦甘酸辛而平下氣消食快膈化痰解酒毒治飲酒人口氣

去腸胃中惡氣散憤懣之氣療妊婦不思食口淡愈痰氣欬

嗽用香藥去核切砂餅內浸酒封固一夜煮蜜拌勻時時含嚥能去濁惡之氣無滯而

虛者禁之孕婦氣虛者勿與此柚之屬也其黃而小者為

蜜甯其大者謂之朱藥最大者謂之香藥今人誤稱為香圓

不知香圓即佛手柑也香藥夏初生白花六月成實至冬黃

熟今人於六七月間採其小實曬乾至十月偽枳實枳殼

花紅即林檎○清生津

酸澆甘溫生津治消渴洩精水痢小兒閃癖頭髮豎黃瘰癧瘦弱者乾末和

能多食發熱閉百脈

枇杷葉 瀉肺下氣

苦平清肺和胃而降氣氣下則火降痰消氣有餘便是治熱

欬嘔逆口渴時珍曰火降痰消則嘔者不嘔逆者不逆欬者

瘦將成坐以枇杷葉款冬紫苑杏仁桑皮木通等分大黃減半蜜丸櫻桃大食後夜臥各含化一丸未終劑而愈

虛寒嘔吐風寒欬嗽忌之 葉溼重一兩乾重三錢為氣足

拭淨毛毛射肺令人欬治胃病薑汁塗炙黃治肺病蜜水塗炙黃

枇杷甘酸平止渴下氣利肺氣止吐逆除上焦熱潤五臟多

食發痰熱傷脾同炙肉及熱麪食令人患熱黃疾

楊梅 和利五臟生津

酸甘溫去痰止嘔消食下氣生津和利五臟能滌腸胃除煩

慣惡氣燒灰服斷下痢甚驗 多食令人發熱衄血損齒及

筋忌生葱同食發瘡致痰 杭州蘇州最美青時酸紅後變

紫味如蜜鹽藏蜜漬糖收火酒浸俱佳 樹生癭以甘草釘釘之即除 根

波解砒毒 煎湯漱牙痛洗惡瘡燒灰油調塗湯火傷

石枰皮 瀉腸收脫肛外用染髮

酸瀉而溫能瀉腸止泄痢下血 煨末服 崩帶脫肛 以石榴皮陳壁土加明礬

少許濃煎薰洗再加川倍子炒研末敷而托上之 又能殺蟲浸水汁黑如墨烏鬚方

續雪油中用之 能戀膈成痰痢積未盡者服之太早反為

害也 忌鐵器 酸石榴治瀉痢崩中帶下過食損肺壞齒

榴花千葉者治心熱吐血又研末吹鼻止衄血立效亦敷

金瘡出血

一名白果○清斂肺去濁痰

甘苦收瀉熟食溫肺益氣

色白屬金故入肺

定痰喘斂喘嗽縮小便

止帶濁

帶濁赤者熱傷血分從心小腸來白者溼傷氣分從肺大腸來並有寒熱二證亦有因痰而帶濁者宜二

陳加升

生食降濁痰解酒消毒殺蟲

花夜開人不得見性陰柴二九有小毒故能消毒殺蟲

漿澤手面洗油膩

時珍曰去濁痰之功可以類推

多食則收令太過令人

壅氣腫脹小兒發驚動疳

胡桃

補命門利三焦

味甘性熱肉潤皮瀉

皮斂肺定喘固腎瀉精今藥中罕用若用之當勝金櫻蓮鬚也通命門

利三焦潤腸胃悅肌膚溫肺補腎治痿強陰佐補骨脂一本

一火大補下焦

胡桃屬木破故紙屬火有木火相生之妙古

蠟也時珍曰三焦者元氣之別使命門者三焦之本原命門指所居之府而言為藏精係胞之功三焦者分治之部而名為出納腐熟之司一為體一為用也其體非脂非肉白膜裹之在脊骨第七節兩腎中央系營於脊下通二腎上通心肺貫腦為生命之原相火之主特氣之府人物皆有之生人生物皆由此出內經所謂七節之旁中有小心是也難經誤以右腎為命門高陽生承謬誤脈訣至宋脈陳言戴起宗脈訣刊誤始闢之腎命相通藏精而惡八胡桃頗類其狀皮汁青黑故入北方佐破故紙潤燥而調血三焦通利故上而虛寒使精氣內充血脈通利諸證自除矣

喘嗽

洪邁有痰疾晚對上諭以胡桃三枚薑三片臥時嚼服

消嗽止

洪輯結子病痰喘夢觀音令服人參胡桃湯服之愈

葱白薑茶搗

下而腰腳虛痛內而心腹諸痛外而瘡腫諸毒

皆可除也 動風痰助腎火肺有痰熱命門火熾者勿服

潤燥養血去皮斂滯連皮 油者有毒故殺蟲治瘡 殼外

青皮壓油烏髭髮

榛 補中益氣

甘平調中開胃益氣力實腸胃令人不飢健行久留最易

油壞○以上山果類

荔枝核 宣散寒溼

甘瀼而溫散滯氣辟寒邪治胃脘痛婦人血氣痛殼存性五錢香附一

兩為末每服二錢鹽湯或米飲下名鐵痛散單服醋湯下亦效其實雙結而核肖罌丸腎子也

故治癰疽卵腫有述類象形之義殼存性酒調服加茴香青皮各炒為末酒服亦良

無寒溼滯氣者勿服 燒存性 荔枝甘酸熱解煩渴止

呃逆

荔枝七箇連皮核燒存性為末白湯調下立止

多食令人發熱煩渴齰腫衄血

病齒及火病人尤忌之

殼發痘瘡又解荔枝熱

生荔枝多食則醉以

殼浸水解之此即食物不消還以本物消之之意

花皮根喉痺腫痛煮汁含嚥

龍眼肉

補心脾

甘平潤補心長智

一名益智

悅胃培脾療健忘與怔忡能安神而

熱寐一切思慮過度勞傷心脾及血不歸脾諸證

歸脾湯用為向導者

玉時入口甘先歸脾也凡心脾傷而血耗致有健忘怔忡驚悸及吐血血崩腸風下血等證歸脾湯能引血歸脾而生補之○道家用龍眼肉細嚼待津液生和津汨汨而嚥此即服玉泉之法也

橄欖

宜清肺

甘瀉酸平清肺開胃下氣除煩生津解酒利咽喉解諸毒河

豚毒

投入煮佳

及魚骨哽煮汁 核主治與橄欖同

凡解河豚毒及治諸魚骨

硬如無微攪即以核磨汁

仁甘平而潤唇吻燥痛研爛敷

之腎陰癰腫橄欖核荔枝核山查核等分燒存性研末每服二錢空心茴香湯調下

榧子

殺蟲

甘瀉而平殺蟲

小兒黃瘦有蟲積者宜食之

療痔消積

丹溪曰此肺家

果也多食引火入肺大腸受傷

反綠豆

好食茶葉面黃者每日食榧子七枚

以愈

為度

海松子

潤燥

甘溫而香潤肺開胃散水氣除諸風治肺燥欬嗽

松子一兩胡桃二兩

研膏和熟蜜同柏子仁麻子仁等分研大便虛秘泥滯白濁和九黃者湯下便溏精

滑者勿與有淫痰者亦禁

檳榔消氣行水破脹攻堅

苦溫破滯辛溫散邪瀉胸中至高之氣使之下行性如鐵石

能墜諸藥至於下極攻堅去積消食行痰下水除風醒酒殺

蟲治癰瘰癧結癰癰瘡痢水腫腳氣脚氣沖心者尤須用之

大小便氣秘裏急後重或同木香調氣或墜諸氣至於下

極氣虛下陷者所當遠避嶺南多瘴以檳榔代茶損泄雞

心尖長破之作錦紋者良陰毛生強煎忌火時耳出膿檳榔

膽起者檳榔未醋調敷之

大腹皮 通氣通行水

辛泄肺溫和脾下氣寬胸行水通大小腸治水腫腳氣痞脹

痰膈瘴瘧霍亂 稍涉虛者勿用 取皮酒洗黑豆湯再洗

鴉鳥多棲其樹故宜洗淨 煨用 子辛溫溫與檳榔同功而力稍緩形亦

與檳榔相似腹大而扁 故又名腹檳榔

枳椇子 一名木蜜一名木飴○潤解酒

甘平止渴除煩潤五臟解酒毒 葛根解酒而發散不如枳椇

又兼房勞加葛根于補氣血藥中一貼微汗反倦怠熱如故知氣血虛不宜葛根之散也必得枳椇方可覓而加入即愈

多食發蚘蟲 實率曲如雞距 故俗名雞距 經霜黃赤甚甘

木皮治五痔和五藏

落花生 潤肺補脾

辛甘而香潤肺補脾和平可貴 出閩廣藤生花落地而結

實故名 炒用○以上夷果類

川椒 一名蜀椒○宜散寒溼燥補火

辛大熱有毒入肺發汗散寒治風寒欬嗽入脾暖胃燥溼消

食除脹治心腹冷痛吐瀉癖瘕飲水腫入右腎命門補火

治腎氣上逆 能下行導火歸元 陽衰洩精溲數陰汗 有人冷氣入陰囊腫滿疼悶欲

死以布裹椒厚半寸包囊下熱氣大通 破血通經除癥安虺

蟲聞椒則伏凡蟲蟻腹痛 辟疫伏邪殺鬼疰蟲魚毒 最殺通勞蟲

血底消痿痺行肢節利機關 命門火衰有寒溼者宜之陰

虛火旺之人在所大忌

丹溪曰食椒既久則火自水中生多被其毒也

蜀產肉厚

皮皺爲川椒比秦椒略小去閉口者

能殺

微炒去汗搗去裏

面黃殼取紅用

名椒紅

得鹽良

入腎

杏仁爲使畏雄黃附子防風

款冬涼水麻仁

中其毒者用涼水麻仁漿解之

椒目

通行水

○苦辛小毒頗行水道不行穀道消水蠱除脹

定喘 根辛熱殺蟲煎湯洗腳氣及溼瘡

秦椒

俗名花椒○宜散寒燥溼溫中

辛苦溫有毒溫中散寒燥溼除風下氣殺蟲治上氣欬嗽吐逆疝瘕風溼寒痺利五臟去老血療久痢月閉腹中冷痛產後餘疾惡血痢腹痛 禁忌修治俱同川椒 比川椒味短

紋低惡苦蔓防葵畏雄黃

手足心腫風也椒未鹽等分醋和敷

胡椒

燥快膈消痰

辛大熱有毒溫中下氣快膈消痰治寒痰食積腸滑冷痢陰

毒腹痛胃寒吐水牙齒浮熱作痛

合華菱散之

殺一切魚肉鼈蠶

毒

劉伯溫多能鄙事方蜈蚣蟻傷胡椒嚼封之即不痛

世人因其快膈嗜之者眾然

損肺走氣動火動血損齒昏目發瘡痔臟毒必陰氣至足者

方可用 畢澄茄即胡椒之大者乃一類二種主治略同亦

易僭上

吳茱萸

宜散風寒燥溼疏肝下氣

辛苦大熱有小毒疏肝燥脾溫中下氣除溼解鬱去痰殺蟲

開腠理逐風寒治厥陰頭痛陰毒腹痛痛在少腹嘔逆吞酸俗名醋心

亦有吐酸者宜降火清痰用吳茱萸作向導藥中丞苦痰飲十日一發頭痛背寒嘔酸不食得一方名吳仙丹吳茱萸湯泡七

次與茯苓等分蜜丸服之而愈痞滿噎膈食積瀉痢血痺陰疝奔豚癥瘕痔

疾腸風腳氣水腫口舌生瘡為末醋調貼足心過夜便愈能引熱下行衝脈為病

氣逆裏急宜此主之性雖熱而能引熱下行段成式西陽雜俎言椒性善下吳茱萸性上

似不盡然宗奭曰此物下氣甚速東垣曰瀉陰不降厥氣上逆膈塞脹滿非吳茱萸不可治也利大腸壅氣

下產後餘血損氣動火昏目發瘡病非寒滯有溼者勿用

即有寒溼者亦宜酌量少用開口陳久者良滾湯泡去苦

烈汁止嘔黃連水炒治疝鹽水炒治血醋炒惡丹參硝石畏

紫石英

茶 瀉熱清神消食

苦甘微寒下氣消食去痰熱除煩渴清頭目

得春初生發之氣故多肅清上

膈之功湯液云苦寒不行如何是清頭目蒙釜曰熱下降則上自清矣

醒昏睡

能清神景岳云飲濃茶即不睡

者以心氣被伐而然解酒食油膩燒炙之毒

與薑等分濃煎名薑茶飲治赤白痢茶助陰薑助陽

使寒熱平調並能

利大小便止頭痛

千金療卒頭痛如破非中冷中風由痰厥氣上

消暑解酒食毒取吐直吐出膽汁乃已渴而即瘥

愈癭瘡

寒胃

濃茶能引吐消

脂最能去油酒後飲茶引入膀胱腎經患癭疝水腫空心尤忌

味甘而細者良

茶稟天地至清之氣產於瘠砂之間顯感雲露之滋培不受纖塵之滓穢故能清心滌腸

胃為清貴之品昔人多言其苦寒不利脾胃及多食發黃消瘻之說此皆語其粗惡苦澀者爾故入藥須擇上品方有利

益
茶子搗仁洗衣去油膩○以上味類

瓜蒂一名瓜丁。宣涌吐。

苦寒有小毒。陽明胃吐藥能吐風熱痰涎。上膈宿食。

吐去上焦之邪。

經所謂其高者因而越之。在上者涌之。木鬱達之。是也。瓜蒂散越以瓜蒂淡豉之苦涌以赤小豆之酸吐去上焦有形之物。則木得舒暢。天地交而萬物通矣。丹溪曰。吐中就有發散之義。子和曰。諸汗法古方多有之。唯以吐發汗。世罕知之。故子嘗曰。吐法兼治風眩頭痛懊憹不眠癰癩喉痹上脫痞鞭汗其以此夫。

頭目溼氣。

鼻。

水腫黃疸。

或合赤小豆煎或吹鼻中取出黃水。

溼熱諸病。

類編云。

病胸喘不止。遇道人教取瓜蒂七枚。為末調服。即吐痰如膠黏三進而病如掃。凡取吐者。須天氣清明。巳午以前行之。令病人隔夜勿食。卒病者不拘。損胃傷血耗氣奪神。上部無實邪者。切勿。

輕投。

當吐而胃弱者代以參蘆。

甜瓜。

俗名。

性冷。有小毒。損陽。

雖能解暑然夏多食。

之深秋未有不下痢者。凡瓜皆冷利。早青尤甚。

瓜葉無髮搗汁塗之即生。

西瓜 瀉暑熱

甘寒 瓜性寒暴之尤寒舊含賦云瓜暴則寒油煎則冷物性之異也 解暑除煩利便醒酒止

渴清熱 洪忠宣松漠紀聞云有人苦目病或令以西瓜皮切片暴乾日日服之遂愈由其性冷降火故也

多食傷脾助溼 暑證多溼者大忌之衛生歌云瓜概生冷宜少食免致秋來成瘡痢 有寒溼者

忌之

甘蔗 和中潤燥

甘微寒和中助脾除熱潤燥消痰止渴解酒毒利二便治嘔

噦噎膈反胃 和薑汁服 大便燥結 外臺方嚼噦或搗汁治發熱口乾便瀉 胃寒嘔

吐中滿滑瀉勿食 搗汁 虛耗欬嗽口乾涕唾用蔗漿升半青梁米四合煮粥日食二次極潤

肺心

白沙糖補和血

甘温

蔗漿寒經火煎鍊成糖則温

補脾緩肝潤肺和中消痰治嗽 中滿

者勿服多食助熱損齒生蟲 凝結作餅塊如石者為石蜜

輕白如霜者為糖霜堅白如冰者為冰糖

食韭口泉沙糖湯解之

紫沙糖

補和中和血

按用與白者相倣而稍遜和血則紫者為優

今產後服之取血和而惡露自

也行

蔗漿煎鍊至紫黑色其性較白沙糖更温生胃火助溼

熱損齒生蟲作湯下小兒丸散誤矣

痘不落痂沙糖調新汲水一盃服白湯調亦可

○以上糖類

蓮子

古名藕實○補心脾腎精固腸

甘平而瀉能交水火而媾心腎安靜上下君相火邪

古方治心腎不

交勞傷白濁有蓮子清

瀉精氣厚腸胃治脾泄久痢白濁夢

遺女人崩帶一切血病

大便燥者勿服

去心皮蒸熟焙

乾得枸杞白朮山藥茯苓

蓮子中青心苦寒清心去熱

眼赤作痛蓮子末一盞
粳米半升煮粥常食

石蓮子

開胃去溼熱

苦寒清心除煩開胃進食去溼熱瀉治噤口痢

同人參等分用較丹埃黃

連人參啣之為穩

淋濁諸證

無溼熱而虛寒者勿服

蓮之黑而

沈水者

石蓮入水必沈入鹵反浮煎鹽人用以試鹵蓮浮至

不老今肆中石蓮產廣中
樹上其味大苦不宜入藥

杵碎

蓮蕊鬚清精

甘平而瀉略與蓮子同功清心通腎益血固精烏髮黑髮止

夢洩遺精吐崩諸血 小便不利者勿服 忌地黃慈蒜

藕節清止血

瀉平解熱毒消瘀血療產後血悶和地黃研汁入止吐衄淋

痢一切血證搗汁飲

藕生涼血散瘀熟補心益胃

生用甘寒涼血散瘀產後忌生冷唯藕不忌為能去瘀故也

不凝一人病血淋痛脹欲死時珍以藕汁調髮灰每服二錢

三日而愈梅師方產後餘血上沖煮汁服○血見藕皮煨散

不凝可見藕亦損血之物止渴除煩解酒毒蠶毒搗汁熱治上焦痰熱同

亦損血之物酒調服

汁小便熱淋

生地汁葡萄汁等分入蜜溫服

傷寒時氣煩渴金瘡傷折上

俱生搗汁○卒中毒箭者藕汁飲多多益善

熟搗塗圻裂凍瘡澄粉可口煮熟汁

平

市中所賣熟藕俱用礮水煮不宜食

蓮花貼天泡瘡甚效

荷葉

輕宜開陽散瘀

苦平其色青其形仰其中空其象震

震仰盂

感少陽甲膽之氣

燒飯合藥裨助脾胃而升發陽氣

潔古枳朮丸用荷葉燒飯為丸

痘瘡倒靨

者用此發之

強靈等分為末胡荽湯下

能散瘀血留好血治吐衄崩淋損

傷產瘀一切血證洗腎囊風

真一日荷葉研末酒服三錢治遺精夢泄東垣曰雷頭風證頭

面疙瘡腫痛憎寒壯熱狀如傷寒病在三陽不可過用寒藥重劑誅伐無過處清震湯治之荷葉一放升麻蒼朮各五錢煎

升散消耗虛者禁之

凌古名芡實俗名菱角○消暑

甘寒安中消暑止渴解酒 多食傷人臟腑損陽氣若過食壞脹者

可暖薑酒

服之即消

有兩角三角四角之殊

王安貧武陵記以三角四角者為芡兩角者為

菱菱花隨月而轉猶葵花之向日

芡實一名雞頭○補脾濟精

甘平而瀉補脾固腎助氣瀉精治夢遺滑精解暑熱酒毒療

帶濁泄瀉小便不禁 大小便不利者勿服小兒不宜多食

甚難消化 蒸熟搗粉瀉精藥或連殼用

藟一名烏芋一名地栗○瀉熱消食

甘寒而滑消食攻積除胸中實熱治五種噎膈氣噎食噎勞

本草從新

卷之五 諸虛百損

大 卷之十

膈亦有五憂膈悲消渴黃疸血證蠱毒末服能毀銅
合銅錢

食之則錢化可見為消堅削積之物故能開性極涼湯有

五膈消宿食也○誤吞銅者同胡亂食即化

冷氣人不可食致腹脹氣滿小兒食多臍下結痛孕婦尤為

大忌小兒口瘡用勃磨

慈菇通行血

苦甘微寒主治百毒產後血悶攻心欲死產難胞衣不出搗

汁服一升又下石淋多食發腸風痔漏崩中帶下腳氣癰

風又使人乾嘔損齒失顏色皮肉乾燥慈菇葉調蚌粉○以

上水果類